



MINISTERUL SĂNĂȚĂII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL NAȚIONAL de SUPRAVEGHERE și CONTROL AL BOLILOR TRANSMISIBILE

Tel.: (+40 21) 317 9702 Fax: (+40 21) 318 3634 ; E-mail: cnscbt@insp.gov.ro

Recomandari pentru personalul care lucreaza la serviciul de ambulanta

Pana in acest moment cazuri de infectie umana cu noua tulpina de coronavirus (2019-nCoV) au fost confirmate in mai multe provincii din China si in mai multe state de pe glob. Investigatia epidemiologica desfasurata pentru aceste cazuri sugereaza ca **transmiterea de la om la om este deja dovedita**.

Semnele si simptomele bolii constau in febra (minimum 38⁰C) sau istoric de febra, tuse +/- dificultate la respiratie (scurtarea respiratiei). Formele severe necesita internare peste noapte. La pacienti nu a fost identificata o alta etiologie care sa justifice pe deplin tabloul clinic.

Persoanele respective au istoric de calatorie in China, in orasul Wuhan, Provincia Hubei (dar trebuie avute in vedere si alte provincii afectate din China), in perioada de **14 zile** anterioare debutului sau pacientul face parte din categoria personalului **medico-sanitar** care a lucrat in zonele in care se acorda ingrijiri pacientilor cu SARI de etiologie necunoscuta.

Recomandari:

Dispecerii care preiau informatia vor intreba toate persoanele care solicita ambulanta daca au vreun simptom de **infectie respiratorie febrila** si, de asemenea, daca acea persoana sau cineva din anturaj a prezentat sau prezinta febra (minimum 38⁰C) sau istoric de febra, tuse, dificultate la respiratie (scurtarea respiratiei) si daca a **calatorit/lucrat** in intervalul de **14 zile** inaintea debutului, in zone la risc pentru transmiterea virusului.

Informatiile preliminare despre antecedentele bolnavului, solicitate de catre dispecerat, sunt **foarte importante** in evaluarea atitudinii care trebuie luata fata de bolnav.

Dispeceratul trebuie sa informeze echipajul care se deplaseaza la pacient despre informatiile primite.

Evaluarea pacientului si atitudinea fata de el:

1. daca provine dintr-o zona **fara** raportare de circulatie a noii tulpini de coronavirus:
 - pacient fara afectiune respiratorie - personalul ambulantei ia masurile de protectie de rutina;
 - pacient **cu simptomatologie respiratorie febrila** - se va evalua expunerea la risc (daca a calatorit in perioada de 14 zile in zone geografice in care s-au raportat cazuri confirmate sau a fost contact cu o persoana care a calatorit in acele zone) si i se va aplica pacientului, pe nas si gura, o masca standard de tip chirurgical * .
2. daca provine dintr-o zona **cu** circulatie a noii tulpini de coronavirus:
 - indiferent daca prezinta sau nu simptomatologie respiratorie febrila (febra, tuse, dificultate la respiratie), pana la evaluarea realizata de medic trebuie sa i se aplice o masca standard de tip chirurgical* .

* Exista posibilitatea ca pacientul sa nu tolereze masca pe nas si gura, de aceea personalul ambulantei trebuie sa ia masuri de precautie anterior expunerii si sa poarte halate protectoare de plastic, manusi de unica utilizare nesterile, protectoare oculare, masti/dispozitive respiratorii de tip N95. De asemenea, probleme mai pot aparea la transportul copiilor, deoarece sunt greu de gasit masti si dispozitive pe marime.

Masuri care se impun pentru **personalul medical** in cazul :

- cand trateaza un pacient suspect, trebuie sa poarte: dispozitiv respirator de tipul N95, protectoare pentru ochi (ochelari, aparatoare special destinate), manusi de unica folosinta nesterile si halate protectoare de plastic;
- cand pacientul nu este suspectat de infectie cu noua tulpina coronavirus, dar care prezinta simptome respiratorii febrile trebuie sa:
 - aplice o masca chirurgicala pe nasul si gura pacientului;
 - sa promoveze toate masurile de rutina pentru aceasta situatie si sa utilizeze manusi de unica folosinta nesterile la contactul cu pacientul, secretiile acestuia sau suprafetele contaminate. Dupa contact, aruncarea manusilor / a echipamentului de unica utilizare se va efectua intr-un loc special destinat, personalul trebuie sa se spele pe maini sau sa se curete cu dezinfectante pe baza de alcool.

Este foarte **important** ca in compartimentul unde este transportat bolnavul sa se realizeze o **aerisire/ventilatie a aerului**, in vederea reducerii, pe cat posibil, a concentratiei de aerosoli.

Dupa efectuarea transportului pacientului suspect sau confirmat cu infectie cu noul coronavirus:

- vehiculul trebuie bine aerisit prin deschiderea geamurilor si usilor si cu sistemul de ventilatie pornit. Aceasta operatiune trebuie efectuata in aer liber si departe de traficul pietonilor;
- dupa aerisire urmeaza o curatare de rutina a vehiculului si a echipamentului care nu este de unica utilizare, cu dezinfectanti obisnuiti, pe baza de alcool sau clor;
- echipamentul de unica folosinta al personalului medical va fi colectat intr-un recipient special destinat, dupa care personalul se va spala riguros pe maini sau va folosi un dezinfectant pe baza de alcool.

Personalul care transporta un pacient cu simptome de infectie respiratorie acuta trebuie sa anunte spitalul unde este va ajunge pacientul, astfel incat sa poata fi luate toate masurile de prevenire a raspandirii virusului.

Intocmit, redactat:
Dr.Roxana Șerban